

LVG

LES ESSENTIELS

La lymphogranulomatose vénérienne (LGV)
bactérie de la famille du Chlamydia trachomatis

COMMENT SE TRANSMET LA LVG



Pénétration anale
ou vaginale sans condom



Partage de
jouets sexuels



Sexe oral



Lésions



Accouchement

LES MOYENS DE PROTECTION



Condom externe



Condom interne



Gants en latex



Digue dentaire

SYMPTÔMES ET COMPLICATIONS

L'infection à la LVG est généralement asymptomatique.

Lorsqu'il y a des symptômes, ceux-ci apparaissent entre 2 et 60 jours après la transmission.

LA LGV ÉVOLUE EN 3 PHASES DISTINCTES

1. PHASE PRIMAIRE

Un chancre (plaie indolore) qui passe souvent inaperçue se développe.

2. PHASE SECONDAIRE

- Fatigue, fièvre
- Douleurs musculaires ou articulations
- Brûlures à l'urètre / inflammation du col de l'utérus
- Ganglions sensibles
- Éruptions cutanées et rougeurs
- Écoulements au niveau de l'anus

****Chez les personnes avec un vagin, cette phase est souvent asymptomatique.****

3. PHASE TERTIAIRE

- Troubles cardiovasculaires
- Troubles neurologiques
- Destruction des tissus des organes internes

DÉPISTAGE ET TRAITEMENT

- Une prise de sang permet de mettre en évidence l'infection. En cas de symptômes, des prélèvements peuvent être effectués au niveau de l'anus, du rectum, de l'urètre ou du col de l'utérus.
- Le traitement par antibiotiques permet de faire complètement disparaître l'infection.
- **Les lésions de la peau offrent au VIH une porte d'entrée dans l'organisme.**
- **Un diagnostic de LGV nécessite fréquemment un dépistage du VIH, à confirmer 3 mois plus tard si négatif.**

BON À SAVOIR

- Entre 2005 et 2018, 659 cas de LGV ont été déclarés.
- Il n'y a pas d'immunisation du système suite à une LVG, il est donc possible de la contracter à nouveau.

Téléphone: 514 523-4636

Textez au: 514 400-9301

PORTAIL
VIH/sida du Québec

Site web: pvsq.org

Courriel: info@pvsq.org