

CHLAMYDIA

LES ESSENTIELS

La chlamydie est une infection causée par la bactérie *Chlamydia trachomatis*

COMMENT SE TRANSMET LA CHLAMYDIA



Pénétration anale
ou vaginale sans condom



Partage de
jouets sexuels



Accouchement



Sexe oral

SYMPTÔMES ET COMPLICATIONS

***La majorité du temps, les ITSS
ne causent pas de symptômes ***

- Pertes vaginales anormales
- Douleurs ou démangeaisons aux testicules
- Sensation de piqûre ou brûlure en urinant
- Écoulement blanchâtre par l'urètre et l'anus
- Douleurs dans le bas du ventre
- Saignements anormaux du vagin après des relations sexuelles
- Douleurs pendant les rapports sexuels

LES MOYENS DE PROTECTION



Condom externe



Condom interne



Digue dentaire

DÉPISTAGE

- La période fenêtre pour pouvoir dépister une infection à la Chlamydia est de 14 jours.
- Le dépistage peut être fait en fonction des pratiques sexuelles, même en l'absence de symptômes.
- Des prélèvements peuvent se faire au niveau du col de l'utérus, dans l'urètre, dans l'anus et aussi dans la gorge. Un échantillon d'urine peut également être prélevé.

TRAITEMENT


- Le traitement par antibiotiques permet de faire complètement disparaître l'infection.
- Il est préférable de ne pas avoir de contact sexuel jusqu'à la fin du traitement OU jusqu'à 7 jours suivant la prise d'un traitement à dose unique pour éviter les réinfections.
- Il est recommandé d'informer ses partenaires sexuels des deux derniers mois lors d'un diagnostic positif de la Chlamydia.
- **Une infection à chlamydia non traitée facilite la transmission du VIH.**

BON À SAVOIR

- Il ne faut pas uriner ou éjaculer deux heures avant de passer le test de dépistage ou de diagnostic.
- Le traitement est gratuit et le traitement peut être accessible bien avant d'avoir le résultat de son test lors du dépistage.
- Il n'y a pas d'immunisation du système suite à une infection à la Chlamydia, il est donc possible de la contracter à nouveau.
- Il est possible de se faire prescrire le traitement antibiotique gratuitement et sans attendre l'apparition possible de symptômes si un.e partenaire reçoit un diagnostic positif pour la Chlamydia.
- Dans le cas d'un contact avec une personne positive à la chlamydia, le traitement est accessible avant l'obtention des résultats de son test lors des dépistages et ce, sans attendre l'apparition possible de symptômes.
- La période fenêtre minimale pour pouvoir dépister une infection à la chlamydia est de 48 heures, mais une période de 14 jours est optimale pour assurer un résultat fiable.

LA CHLAMYDIA EN CHIFFRES

Nombre de diagnostics au Québec



Téléphone: 514 523-4636

Textez au: 514 400-9301

PORTAIL
VIH/sida du Québec

Site web: pvsq.org

Courriel: info@pvsq.org