

# LES MORPIONS

## LES ESSENTIELS

Les morpions sont des parasites qui se logent principalement à la racine des poils de la zone pubienne et se nourrissent de sang humain. Ces insectes s'accrochent aux poils et pondent des oeufs. Un morpion adulte peut vivre jusqu'à 2 semaines et pondre 4 oeufs par jour.

### COMMENT SE TRANSMETTENT LES MORPIONS



Contact anal ou vaginal avec ou sans pénétration



Contact avec des poils infectés



Contact indirect avec une personne porteuse par l'intermédiaire d'objets



Plus rarement, contact par le siège de toilette ou le partage d'objets

### SYMPTÔMES ET COMPLICATIONS

**Pour se nourrir du sang humain, les morpions perforent la peau et y laissent une substance qui peut causer des réactions cutanées.**

- Démangeaisons intenses
- Petits points bleus
- Rougeurs
- Présence d'oeufs blancs sur les poils

**Si non traité, les risques de complications sont les suivants:**

- Prolifération des parasites
- Fièvre et malaises
- Migration à d'autres endroits sur le corps

## LES MOYENS DE PROTECTION

- Les partenaires et membres du foyer doivent être traité-e-s.
- Éviter d'échanger les vêtements et la literie.
- Éviter de se gratter.
- Laver régulièrement tous les tissus en contact avec la peau.

## DÉPISTAGE ET TRAITEMENT

Les morpions sont difficilement visibles à l'oeil nu, c'est pourquoi il est conseillé de prendre rendez-vous avec un-e médecin pour les identifier.

...

Dans le cas d'un diagnostic positif, une crème pédiculicide est disponible en pharmacie sans ordonnance.

...

Le traitement doit être appliqué sur la région du pubis (préférentiellement rasée) une première fois puis, une seconde fois 7 jours plus tard pour éliminer les larves en éclosion.

...

Laver à l'eau très chaude tous les tissus et objets qui ont été en contact avec la peau.

## BON À SAVOIR

- Les morpions ne peuvent pas transmettre d'ITSS.
- Il est normal que les démangeaisons se poursuivent jusqu'à plusieurs semaines après le traitements.
- Pour les personnes enceintes ou qui allaitent, la prise du traitement peut être contre-indiquée.

Téléphone: 514 523-4636

Textez au: 514 400-9301

**PORTAIL**  
VIH/sida du Québec

Site web: [pvsq.org](http://pvsq.org)

Courriel: [info@pvsq.org](mailto:info@pvsq.org)