

SYPHILIS

LES ESSENTIELS

La syphilis est une infection causée par la bactérie *Treponema pallidum*

COMMENT SE TRANSMET LA SYPHILIS



Pénétration anale ou vaginale sans condom



Partage de jouets sexuels



Sexe oral

VOIE SANGUINE



Partage de matériel de consommation de drogue



Lésions



Accouchement

LES MOYENS DE PROTECTION



Condom externe



Condom interne



Digue dentaire

SYMPTÔMES ET COMPLICATIONS

La syphilis, lorsqu'elle n'est pas traitée, se développe en différents stades. Cette évolution s'échelonne sur une longue période.

LA SYPHILIS ÉVOLUE EN 3 PHASES DISTINCTES

1. PHASE PRIMAIRE

Un bouton rouge apparaît à la surface de la peau, puis la bactérie forme un petit chancre indolore d'environ 1 cm de diamètre: généralement situé dans la région génitale, ce petit ulcère passe souvent inaperçu.

Les symptômes de la phase primaire disparaissent d'eux-mêmes après 1 ou 2 mois, même en l'absence de traitement. L'infection n'est toutefois pas guérie et peut toujours être transmise.

2. PHASE SECONDAIRE

La syphilis se répand dans l'organisme et peut causer les symptômes suivants:

- Fatigue, fièvre
- Douleur musculaire ou articulations
- Perte de cheveux
- Éruptions cutanées et rougeurs
- Ganglions enflammés
- Inflammation de l'oeil

Les symptômes de la phase secondaire peuvent se résorber d'eux-mêmes. Autour de la 2e année, l'infection entre en période de latence, phase complètement asymptomatique qui peut durer jusqu'à 30 ans. La syphilis n'est plus transmissible à partir de la troisième année environ.

3. PHASE TERTIAIRE

La phase tertiaire peut causer les symptômes suivants:

- Troubles cardiovasculaires
- Troubles neurologiques
- Destruction des tissus des organes internes

Cette phase touche environ 15 à 30% des personnes qui ne sont ni diagnostiquées ni traitées. La syphilis n'est pas transmissible pendant cette phase.

DÉPISTAGE ET TRAITEMENT

- Le dépistage de la syphilis se fait par prise de sang et la confirmation du résultat par le prélèvement des zones où la bactérie se trouve.
- Le traitement par antibiotique est efficace pour toutes les phases de l'infection: il ne répare cependant pas les lésions des phases secondaires et tertiaires. Certains effets indésirables graves de la phase tertiaire ne sont pas réversibles.

BON À SAVOIR

- Les personnes ayant eu un contact avec un-e partenaire portant la bactérie peuvent se faire prescrire le traitement gratuitement, sans attendre l'apparition de symptômes.
- **La présence du VIH dans l'organisme peut amener un faux résultat positif au dépistage de la syphilis.**
- Il est possible de se faire prescrire le traitement antibiotique gratuitement et sans attendre l'apparition possible de symptômes si un-e partenaire reçoit un diagnostic positif pour la syphilis.
- Il n'y a pas d'immunisation du système suite à une infection par la syphilis. 7 jours suivant le traitement par injection, il est recommandé d'utiliser un condom afin d'éviter les réinfections.
- **Les lésions de la peau causées par la syphilis sont susceptibles d'offrir au VIH une porte d'entrée dans le corps.**