




VPH

LES ESSENTIELS



Le VPH est l'infection sexuellement transmissible la plus courante au Canada: on estime qu'au pays, environ 70% des personnes sexuellement actives et non-vaccinées contacteront le VPH au moins 1 fois dans leur vie.

COMMENT SE TRANSMET LE VPH



Pénétration anale
ou vaginale sans condom



Partage de
jouets sexuels



Sexe oral

*****Même si c'est une ITSS, le VPH ne se transmet pas au contact du sang.*****

SYMPTÔMES ET COMPLICATIONS

*****La majorité du temps, les ITSS ne causent pas de symptômes*****

- Les condylomes sont des verrues de tailles variables qui peuvent être situés plusieurs endroits sur le corps, généralement autour de la région génitale et/ou anale.
- L'infection par le VPH peut entraîner des complications en lien avec la grossesse et/ou l'accouchement.
- Les condylomes sont parfois minuscules et donc invisibles à l'oeil nu.
- Les VPH causent près de 100 % des cancers du col de l'utérus, entre 60 et 90 % des autres cancers génitaux (vagin, vulve, pénis et anus) et 70 % des cancers de l'oropharynx.
- Les VPH causent 100 % des condylomes (verrues génitales).

LES MOYENS DE PROTECTION



Condom externe



Condom interne



Digue dentaire

VACCINATION

Le vaccin préventif protège des principales souches de VPH responsables des cancers et des condylomes (types 6 et 11). Le vaccin est proposé gratuitement aux **jeunes personnes âgé-e-s de 9 à 18 ans** dans le cadre scolaire ainsi qu'aux **personnes ayant un vagin de 18 à 26 ans**, particulièrement à celles qui ont un système immunitaire affaibli.

Les HARSAH cisgenres et trans âgés de 26 ans ou moins peuvent se faire aussi vacciner gratuitement contre le VPH.

DÉPISTAGE ET TRAITEMENT

- Des tests de dépistages pour le VPH seront effectués lors de l'apparition de condylomes.
- Il est possible de traiter les symptômes du VPH et non le virus lui-même. Ils peuvent donc réapparaître après le traitement.
- Pour prévenir les complications, les professionnel-le-s de la santé peuvent traiter les verrues par des crèmes, produits chimiques, brûlure par le froid (cryothérapie) ou au laser.
- **Les condylomes causent une inflammation de la peau qui peut accroître la probabilité de transmission du VIH.**

BON À SAVOIR

- La présence de verrues génitales chez un-e partenaire régulier-ère n'est pas le signe d'infidélité, le virus peut se trouver à l'état latent pendant une longue période avant l'apparition de symptômes.
- Lorsque que vous recevez un diagnostic de VPH, il est recommandé d'aviser vos partenaires sexuels des 2 derniers mois.

LE VPH EN CHIFFRES

Chez les personnes ayant un pénis, 85% des cellules cancéreuses surviennent dans la bouche et la gorge.

Chez les personnes ayant un vagin, 80% des cellules cancéreuses surviennent autour des organes génitaux.

Le Partenariat canadien contre le cancer estime que le VPH est à l'origine d'environ 3 800 nouveaux cas de cancer au Canada par année, et que ce nombre passera à 6 600 d'ici 2042.

Téléphone: 514 523-4636

Textez au: 514 400-9301

PORTAIL

VIH/sida du Québec

Site web: pvsq.org

Courriel: info@pvsq.org